

# Symptom och behandling vid allergisk reaktion och anafylaxi

## Basen i all anafylaxibehandling är Adrenalin!

### Allergisk överkänslighetsreaktion: (Ingen andnings eller cirkulatorisk påverkan)

Övervaka, informera röntgenläkare och kontakta akutmottagningen.

Vuxna (och barn över 12 år)

SYMPTOM	BEHANDLING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hud:</b> Klåda. Flush. Urtikaria. Angioödem (uttalad ansiktssvullnad).</li> <li>- <b>Ögon/näsa:</b> Ögonrodnad. Rinnsnuva. Nästäppa. Klåda/nysningar.</li> <li>- <b>Mun och mag-/tarm:</b> Munklåda. Läpp/tungsvullnad. Illamående. Lindrigare buksmärta, ibland kräkning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalla på hjälp. Kontakta närmaste läkare.</li> <li>- Lugnt och stillsamt omhändertagande.</li> <li>- Säkra venös infart.</li> </ul> <p><b>Läkemedel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabl Caredin® munlöslig 10 mg.</li> <li>• Tabl Betapred® 0,5 mg, 16 st upplösta i vatten.</li> <li>- Kontakta akutmottagningen inför eventuellt fortsatt handläggning.</li> </ul>

## Anafylaxi

Vuxna (och barn över 12 år)

SYMPTOM	BEHANDLING
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allergisk överkänslighetsreaktion enligt ovan <b>OCH</b> andnings-/cirkulationspåverkan.</li> <li>- <b>Andning:</b> Tilltagande bronkobstruktion. Heshet. Skällhosta. Andnöd =&gt; Cyanos =&gt; Andningsstopp.</li> <li>- <b>Cirkulation:</b> Takykardi =&gt; BT-fall =&gt; Arytmi =&gt; Hjärtstillestånd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalla på hjälp och <b>larma 50 000</b> från valfri sjukhustelefon eller använd larmpanel</li> <li>- Ange "Livshotande vuxen".</li> <li>- Fri luftväg. Syrgas 10 L på mask + pulsoxymeter.</li> <li>- Säkra intravenös infart och koppla Ringer-Acetat 1000 ml.</li> </ul> <p><b>Läkemedel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autoinjektor Jext® 300 µg</b> im lårets utsida. Upprepas efter ca 5 minuter om utebliven effekt.</li> <li>• <b>Inj Betapred® 4 mg/ml</b>, 2 ml im eller iv.</li> <li>- Om utebliven effekt/fördjupad anafylaxi trots upprepade Jext-injektioner im ge: <b>Inj Adrenalin 0,1 mg/ml</b>, 1 ml iv.</li> </ul> <p><b>OBS: EKG-övervakning!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anafylaktisk chock/andnings-/cirkulationsstillestånd: <b>Starta HLR!</b></li> </ul>

## Barn, 0-11 år

(>12 år= vuxenbehandling, se ovan)

### Allergisk överkänslighetsreaktion: (Ingen andnings eller cirkulatorisk påverkan)

Övervaka, informera röntgenläkare och kontakta barnakutmottagningen.

#### Barn

SYMPTOM	BEHANDLING
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Hud:</b> Klåda. Flush. Urtikaria. Angioödem (uttalad ansiktssvullnad).</li><li>- <b>Ögon/näsa:</b> Ögonrodnad. Rinnsnuva. Nästäppa. Klåda/nysningar.</li><li>- <b>Mun och mag-/tarm:</b> Munklåda. Läpp/tungsvullnad. Illamående. Lindrigare buksmärta, ibland kräkning.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kalla på hjälp. Kontakta närmaste läkare.</li><li>- Lugnt och stillsamt omhändertagande.</li><li>- Säkra venös infart.</li></ul> <p><b>Läkemedel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tabl Caredin® munlöslig 6–11 år 5 mg, 0–5 år 2,5 mg.</li><li>• Tabl Betapred® 0,5 mg upplösta i vatten: 6-11 år 12 st. 1-5 år 8 st.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontakta barnakutmottagningen inför eventuellt fortsatt handläggning.</li></ul>

### Anafylaxi

#### Barn

SYMPTOM	BEHANDLING
<ul style="list-style-type: none"><li>- Allergisk överkänslighetsreaktion enligt ovan <b>OCH</b> andnings-/cirkulationspåverkan.</li><li>- <b>Andning:</b> Tilltagande bronkobstruktion. Heshet. Skällhosta. Andnöd =&gt; Cyanos =&gt; Andningsstopp.</li><li>- <b>Cirkulation:</b> Takykardi =&gt; BT-fall =&gt; Arytmi =&gt; Hjärtstillestånd.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kalla på hjälp och <b>larma 50 000</b> från valfri sjukhustelefon eller använd larmpanel.</li><li>- Ange "Livshotande Barn".</li><li>- Fri luftväg. Syrgas 6-10 L på mask + pulsoxymeter.</li><li>- Säkra intravenös infart och koppla Ringer-Acetate 1000 ml.</li></ul> <p><b>Läkemedel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Autoinjektor <b>Jext® 150µg</b> im lårets utsida.</li><li>• Upprepas efter ca 5 minuter om utebliven effekt.</li><li>• <b>Inj Betapred®</b> 4 mg/ml, 6-11 år, 2 ml. 0-6 år, 1 ml: im eller iv.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Om utebliven effekt/fördjupad anafylaxi trots upprepade Jext-injektioner im ge: <b>Adrenalin 0,1 mg/ml, 0,25–1 ml iv.</b></li></ul> <p><b>OBS: EKG-övervakning.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anafylaktisk chock/andnings-/cirkulationsstillestånd: <b>Starta HLR!</b></li></ul>