

Kontrastmedelsreaktion utan radiolog på plats

För att underlätta säkrad iv infart kan PVK lämnas kvar i 30 minuter på samtliga elektiva patienter som undersöks med kontrast intravenöst då radiolog inte finns på plats.

Lätt reaktion – endast hudsymtom

- Kontakta jourhavande radiolog per telefon.
- Lugnt omhändertagande.
- Säkrad intravenös infart.
- Radiolog tar ställning till om farmaka behöver ordineras.
- Röntgensjuksköterskan dokumenterar läkemedlen på avsedd plats i PACS och anger i kommentarfältet vem som ordinerat.
- Patienten kvarstannar 30 minuter. Vid försämring, se nedan. Om patienten mår bra - hemgång.

Allergisk reaktion – andra symtom än enbart hudsymtom.

- Kontakta medicinjour, ange patientens symtom.
- Lugnt omhändertagande.
- Säkrad intravenös infart.
- Medicinläkaren ordinerar eventuell farmaka muntligen.
- Röntgensjuksköterskan dokumenterar läkemedlen på avsedd plats i Sectra PACS och anger i kommentarfältet vem som ordinerat.
- Medicinläkaren dokumenterar i Melior.
- Vid påverkad patient övervakas denne på akutmottagningen.
- Dokumentera händelseförloppet i Sectra PACS.

Allvarlig reaktion/anafylaxi

- Ring 50 000.
- Ange ”livshotande tillstånd” samt plats.
- Ge autoinjektor Emerade 500 mikrogram im lårets utsida (vuxen).
- Ge 10 l syrgas på mask.
- Ta fram akutvagnen.
- Säkrad intravenös infart.
- Invänta larmteamet.
- Dokumentera händelseförloppet i Sectra PACS.