Perifer Angioenheten
Helsingborgs lasarett 2023

DOSERINGSPROTOKOLL FÖR ACTILYS VID TROMBOLYS

Angiojet	Konc	Datum	Dosering (ml)	Sign läk	Påbörjat kl	Sign ssk	Avslutat kl	Sign ssk	Antal ml givna	Total dos (mg)
Power Puls	0,4mg/ml									

Lågdos	Konc	Datum	Dosering (ml)	Sign läk	Påbörjat kl	Sign ssk	Avslutat kl	Sign ssk	Antal ml givna	Total dos (mg)
Bolus	0,1 mg/ml		2,5 ml							
Infusion	0,1 mg/ml		5 ml/timme							
									SUMMA	

ANGIOJET Puls Spray blandning

Använd **50ml NaCl påse/flaska** med infusionsport. **Dra ut 20ml NaCl** från infusionspåse/flaska så det blir **30ml NaCl kvar** i påse/flaska.
Actilyspulver 20mg bereds med medföljande spädningsvätska.
Injicera den färdigblandade flaskan med **20ml Actilys i infusionspåse/flaska**.
Det blir nu **50ml** vätska totalt i färdigblandad påse (styrkan blir 0,4mg Actilys/ml).
Färdigblandad infusionspåse/flaska består av 30ml NaCl plus 20ml Actilys-blandning.

LÅGDOS TROMBOLYS

Actilys pulver (10-20mg) blandas med tillhörande spädningsvätska. Färdig lösning är 1mg/ml oavsett mängd och storlek på flaskan.
5ml av denna lösning blandas med **45ml NaCl i 50/60ml LuerLock spruta**.
Lösningen är efter blandningen med NaCl i sprutan **0,1mg/ml Actilys**.
Färdigblandad spruta (50/60ml) kopplas med förlängningsslang till **Spaceplus Perfusor sprutpump** som finns i skåpet i narkoshörnan.
Normal infusionshastighet är **5ml/tim**. (kan korrigeras efter ordination av angiodoktor).
NaCl (500ml påse) kopplas till **introducerns sidoport** med **Spaceplus Infusomat infusionspump** som injicerar **20ml/tim**.